

## TANAIISIE COMMUNE – *TANACETUM VULGARE* L.

### NOMENCLATURE

Son nom latin de genre a été attribué par Carl von Linné, botaniste suédois, en 1753.

Synonymie : *Chrysanthemum vulgare* (L.) Bernh., *Tanacetum officinarum* Crantz...

Noms vernaculaires : tanaïsie commune, herbe aux vers...

Étymologie : l'origine du mot *tanacetum* est inconnue, pour certains auteurs il pourrait dériver du grec *athanasia*, immortalité ; allusion à sa persistance ? *Vulgare*, commun en raison de sa fréquence dans certaines régions.

### DESCRIPTION BOTANIQUE

Cette plante aromatique vivace de la famille des astéracées, atteint 60 à 120 cm de haut.

La tige porte des feuilles très finement découpées. L'inflorescence ramifiée est composée de capitules jaune d'or, tubulés, sans ligules. La floraison s'échelonne de juin à septembre.

C'est une espèce peu fréquente en Savoie, de l'étage collinéen à montagnard. La tanaïsie, se naturalise souvent dans les friches aux abords des habitations, en compagnie d'autres rudérales telles que *Artemisia vulgaris*, *Daucus carota*, *Melilotus officinalis*, *Erigeron annuus*, *Oenothera biennis*...



“Flora Batava”-KOPS

### USAGE MEDICINAL–TOXICITÉ

En Savoie, Alfred Chabert écrit en 1897, que la tanaïsie était donnée comme emménagogue, comme traitement des vers intestinaux, entrant dans la composition d'onguents vulnérants et était employée contre les coliques du bétail. La plante n'est pas inscrite à la pharmacopée française et n'est plus utilisée actuellement.

### USAGES DIVERS

La tanaïsie déposée dans les lits ou litières en chassait les puces et les tiques. Les feuilles et sommités fleuries donnent des teintures jaune-rouge à vert-olive à la laine selon le mordant.

Sylvie Serve